
DISPUTATIO MEDICA

INAUGURALIS

DE

D I A B E T E .

DISPUTATIO MEDICA

INAUGURALIS

DE

DIABETE;

QUAM,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE REVERENDI ADMODUM VIRI

D. GEORGII BAIRD, SS. T. P.

ACADEMIÆ EDINBURGENÆ PRÆFECTI;

NECNON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU, ET

NOBILISSIMÆ FACULTATIS MEDICÆ DECRETO;

PRO

GRADU DOCTORIS,

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS;

ERUDITORUM EXAMINI SUBJICIT

PATRICIUS ERSKINE,

SCOTO-BRITANNUS:

QUARTÆ CIVICÆ SCOTORUM MILITIÆ COHORTIS

CHIRURGUS;

SOCIET. MEDIC. REG. EDIN. SOC. EXTR.


ET NUPER PRÆSES ANNUUS.

Ad diem 24. Junii, horâ locoque solitis.

EDINBURGI:

EXCUDEBANT ADAMUS NEILL ET SOCII.

MDCCCI.



Digitized by the Internet Archive
in 2020 with funding from
Wellcome Library

CAROLO GULIELMO
DE DALKEITH
COMITI,
VIRO
NON SOLUM
ANTIQUITATE GENERIS
NOBILI,
ET
LITERIS HUMANIORIBUS
ORNATO,
SED ETIAM
CIVITATIS CIVIUMQUE UTILITATIS
STUDIOSISSIMO,
HANC DISPUTATIONEM,
PEREXIGUUM
ANIMI BENEFICIORUM MEMORIS
SIGNUM,
SUMMA OBSERVANTIA
D. D. CQUE
PATRICIUS ERSKINE.

CAROLUS CULLEN
DISPUTATIO MEDICA

IN ADOURALLIS

D I A B E T E

Hic morbus cepit notari ex nimis in-
tensis viribus, quo in rebus hinc co-
gnoscitur, et cum affectu, et cum
super portione modis, et
Cullen, et alii eorum pharmorum or-
dine, et in colore, et in das di-
viti specie, et in aliis, que sunt
D. D. Cullen

PATRICKUS KERR
U.S.

DISPUTATIO MEDICA

INAUGURALIS

DE

D I A B E T E .

HIC morbus cepit nomen ex nimia profusione urinæ, quo præcipuè signo cognoscitur ; eo enim affecti plerumque urinam, super potionum modum, mingunt.

CULLEN, classe *neurosium, spasmorum* ordine, *diabeten* collocavit ; atque in duas divisit species, pro natura urinæ, quæ mingitur.

Unâ specie laborantium urina subdulcis est; atque, vice partium, quæ eam sanorum hominum constituunt, continet, uti periculo compertum est, plus minus materiæ, quæ, cùm gustu, tum partibus constituentibus, saccharum refert, quo quotidie utimur.

Alterâ autem specie, urina dicitur, coloris, pariter ac saporis, expers, sicut ea, quam reddunt *hystericæ* mulieres; neque à sana urina differt, nisi quòd tenuior est et dilutior.

In hac disputatione, mihi in animo est, de prima tantùm specie dicere, quæ, ex urinæ dulcedine, *mellita* appellatur; eòque magis, quòd dubium est, an altera species, quam *insipidam* nominat CULLEN, sit, necne, *idiopathica*. Haud tamen negandum est, quin nonnulli *diabete* tabuerint, quorum urina gustatu non dulcis erat. At verisimillimum tamen est, eorum urinæ aut saccharum infuisse, aut aliquid saccharo simile, uti fortasse comprobâssent experimenta. Namque, *diabeti-*

ci, cujus historiam tradit PEARSON, urina, quanquam plerumque non dulcis, per totum tamen morbum continebat materiam, quæ acefcebat.

SIGNA.

In hac disputatione, mihi in animo est, de
quibusdam signis, quæ in diabete, ex urina
distingui possunt, tractare. Quædam sunt
signa, quæ in diabete, non sunt, quæ
tamen in aliis morbis, sunt. Quædam
sunt, quæ in diabete, sunt, quæ
tamen in aliis morbis, non sunt. Quædam
sunt, quæ in diabete, sunt, quæ
tamen in aliis morbis, non sunt. Quædam
sunt, quæ in diabete, sunt, quæ
tamen in aliis morbis, non sunt.

 SIGNA.

CONFIRMATAM *diabeten* indicant, nimia urinæ, plerumque subdulcis, profusio; inexplibilis fitis; venter vorax; sicca et squamosa cutis; debilitas totius corporis, et macies.

Hic morbus plerumque pedetentim obrepit et insidiosè; neque profectò vero abfimile est, aliquandiu antè incipere et increfcere, quàm, quid ei fit mali, æger suspicatur.

Primum plerumque malum, quod metum injicit, fitis insolita est. Eodem ferè tempore, urina nedum solitò copiosior est, sed etiam, tam odore quàm sapore, à sana differt. Simul perpetua ferme edendi rabies est; atque stoma-

chus

chus subinde cruciatur, sicuti fame stimu-
tus.

Haud ita multò pòst, hæc mala ingraves-
cunt. Urina copiosius adhuc profluit. Nec
fitis expleri, nec fames, potest. Aret pellis,
sicuti squamis cooperta. Desluunt pili. Pau-
latim fugiunt vires. Albida nonnunquam
lingua est, et lentâ pituitâ illita; sed sæpius
rubore suffusa. Gingivæ molles sunt, et spon-
giosæ. Stupefiunt dentes. Spiritus acidum
redolet. Saliva etiam subdulcis esse dicitur.
Aret plerumque os, arentque fauces. Atque
æger dolore quodam et ardore circa præcor-
dia angitur: de dolore etiam lumborum et
renum subinde conqueritur. Tardescit ple-
rumque venter. Animus ad movendum fa-
cilis est, et plerumque demittitur.

Increscente morbo, *hectica* supervenit. Ar-
teriarum motus, morbi initio ferè naturales,
nunc supra modum concitantur. Adves-
perascente

perascente die, incalescunt palmæ manuum, pedumque plantæ. Atque fumma nonnunquam cutis manat sudore, qui, pariter atque oris halitus, acidum olet.

Morbo inveterato, his malis accedunt ea, quæ totius corporis debilitate nascuntur; aqua, nempe, intercus, aliæve hydropis species; neque tamen, his subsequenter, levantur cætera, quæ memoravimus.

Urinæ nunc desiderium frequentius fit frequentiusque, donec urinæ demum prorsus incontinens fiat vesica. Vice edendi rabiei, defectus stomachi est, et urinæ dotes morbi propriæ evanescere dicuntur. Interdiu vires noctuque defluunt. Æger adeò marcescit, ut ossa atque pellis totus fiat, lentâque demum morte consumatur.

Diabetes aliâ aliàs longinquitate est. Interdum, plures in annos, porrigitur. Interdum, intra paucas hebdomadas, finitur.

Signis

Signis communiter memoratis, haud alienum erit, quædam separatiùs, hìc loci, adjungere de urinâ, quæ, hoc in morbo, tantùm à sana descivit.

Urina, etiamsi supra potionum modum profluat, tamen hunc non æquè excedit in omnibus ægris. Nonnulli, viginti quatuor horis, urinam profundunt, quanta quadraginta libras pondere æquat; alii, quanta sextantùm septemve.

Diabeticorum urina, id fanè quod mirum est, nonnunquam cùm potulentorum tum esculentorum modum excedit. Ita esse, nonnulli haud ita pridem subnegârunt; atque contenderunt, urinam ne quidem supra potionum modum esse, dummodo hæ pondere accuratè æstimentur.

Sed, nihil in medicinæ annalibus clariùs constat, quàm *diabete* tabentium urinam, interdum longum in tempus, ingestis et liquidis

dis

dis et solidis, quæ sensibus percipiuntur, gravio-rem esse.

Verùm confitendum tamen est, ex cognitis iis, quæ, de hac re, medici animadverterunt, verisimillimum esse, urinam *diabeticorum* nunquam hæc, quæ assumuntur, tantò excedere, quantò nonnulli medicorum crediderunt; sed multò sæpius assumptas potiones æquare.

Animi affectiones insigniter urinæ profluvium variare videntur. Ita, siquando animus, præter solitum, fit tristis et dimissus, sicut his ægris sæpe accidit, urina pari ferè passu copiosior redditur. Hoc, quod à RUTHERFORD sæpius observatum accepimus, historiis quibusdam apud auctores confirmatur.

Sed nobis considerandum est, non solùm quanta fit urina, sed etiam qualis. Pluris enim interest, qualitates ejus scire, quàm copiam: nam, uti non omnis, qui nimiam urinam profundit, *diabeticus* est, ita probabile est,

est, non omnem *diabeticum*, per totum morbum, nimiam urinam profunderè : at omnibus *diabeticis* commune est, urinam reddere, qualitatibus ei sani hominis absimilem ; neque alio profectò signo ullo tam certò cognoscitur, quo morbo tabescant.

Nullus urinæ color constans et perpetuus est ; ideoque huic nimiùm credere, medici nunquam debent. Aliquando coloris ferme expers est. Plerumque verò melina est, aquæ enim verò concolor, quacum commixtum mel fit. Verùm, etiamsi alius ei aliàs color fit, cæteris tamen proprietatibus ferè semper eadem est. Gustatu subdulcis ; violas subolet. Oleaceus interdum liquor ei supernatans conspicitur.

Chemici, urinâ *diabeticorum* pertentatâ, novitatem rerum ei propriam perspexerunt. Urina sana, ut jampridem compertum est, continet, præter varia alia, materiam ei propriam, quâ à cæteris humoribus dignoscitur. Hanc, *extractivam* olim appellatam, dudum

uream rectiùs nominârunt *chemici* GALLICI, qui, eam penitùs periclitati accuratissimèque, perceperunt, quibusdam proprietatibus differre ab omni alia materia, quæ in animalium corporibus ingeneretur.

Has autem proprietates describere, à re nostra alienum effèt. Ad rem verò pertinebit, memorare, *uream* eam urinæ esse partem, ex qua provenit et ejus odor atque sapor, quæque materiâ albuminosâ commista, citò in putredinem abit, et dein, calore applicato, magnam vim *ammoniæ*, emittit.

Urinæ, tam valentium quàm ægrorum, alia *ureæ* aliàs còpia inest. Urinæ crudæ, qualem profundunt mulieres, quæ in eo sunt, ut *hysteriâ* corripiantur, inest *urea* ferè nulla, vel faltem exiguissima. In ea præsertim urina abundat, quæ, quippe quia aliquot horas, post cibos et potus assumptos, mingitur, *CONCOCTA* appellatur.

Diabeticorum

Diabeticorum urina, aut nullam *uream* continet, aut duntaxat perexiguam; at semper naturam, ei prorsus dissimilem, quæ, uti supra diximus, cum sapore tum cæteris qualitatibus saccharum refert.

Dulcis hæc materia, vaporatâ urinâ, residua est, at aliàs aliâ copiâ. Duodecimam nonnunquam etiam amplius partem vaporatiæ urinæ æquat. Quo gravior morbus urget, eo plerumque copiosior est, eoque meracior. Remittente autem morbo, parcior est, atque urina eam sani hominis magis simulat.

Residua *diabeticorum* urinæ materia non solum gustu et aspectu saccharo similis est, sed variis etiam proprietatibus *chemicis*. Ex ea enim CRUIKSHANKS, *acido nitroso* affuso, *acidum oxalicum* dissociavit, quod, uti contendit, ab *urea* separari non potest. Eiusdem residui aliquid, cui minorem ejusdem acidi copiam admiscuerat, in liquorem abivit, quem

quem nemo, undè paratus effret ignarus, à melle discernere potuiffet.

Ex his deduci potest, materiam quandam *vegetabilem urinæ diabeti-
corum* inesse; quod fanè clariùs adhuc patet ex mutationibus, quas hæc sponte subit. Non enim, sicut sanorum urina, putrefcit, et vapores ammoniacos exhalat; sed sensim in humorem *acetosum* abit, aut, addito fermento idoneo, *vinosam fermentationem* subit, sicut plantarum succi, qui saccharo abundant.

*Diabeti-
corum* urina, quamvis non dulcis gustatu sit, has tamen mutationes, ut PEARSON habemus auctorem, subit; id fanè, quod comprobat, malum habitum *diabeti-
corum* urinæ inesse posse, etiam si gustatu percipi nequeat.

Perinsignia urinæ vitia, quæ notavimus, *diabeti-
cis* propria sunt, et fortasse communia. In aliis autem alia gradu sunt; neque, enim-
vero,

vero, rarò, in eodem, levissimis causis gradu variantur.

Nondum verò periclitatione perciperunt medici, quantùm *diabeticorum* urina, ab ea sanorum, cæteroquin differat. Est autem, quare opinemur, dum sales pauciores parcioresve continet, albumine vel *gelatinâ* abundare; sicut urina omnium, qui, præ stomachi invaletudine, alimentum benè concoquere nequeunt.

Dum perurget *diabetes*, alii itidem humores, à sanguine secreti, alienas sibi qualitates acquirunt: acidum enim proolet sudor, saliva subdulcescit.

Ipse quidem sanguis *diabeticorum* quandam pravitatem capere videtur. Sed, cum nondum pertentando compererint *chemici*, quæ hæc pravitas sit, qualisve, de ea accuratè dicere non possumus.

DOBSON, qui primus, quantum scimus, ad *diabeticorum* sanguinem animum attendit, ferum, ut existimavit, subdulce reperit. Hæc verò

verò de re, se fefellisse videtur ; nam, præter eum, nemo, certè perpauca, feri dulcedinem hætenus percipere potuerunt. Idem, porrò, auctor dicit, ferum, quod pertentavit, colore lacteum fuisse ; atque, quatenus judicare poterant oculi, fero coagulati lactis perfimile.

Sanguinis, quem periclitatus est ROLLO, ferum ei prorsùs convenit, quod descripsit DOBSON, neque insuper sapore multùm differebat ab eo lactis coacti, cui plus justo coaguli inditum sit.

Diabete macescentium sanguis, ab eo sanorum, hoc maximè differt, quòd ægrè tardèque putrescit. Hoc morbo tabescentis, quem literarum memoriæ consignavit ROLLO, sanguis, post sexdecim dies nihildum ferè vitii ceperat ; quamvis is ex sano homine detractus, iisdemque per omnia commissus, dimidio minus tempore, imputruisset.

Quanquam, his cognitis, nihil, pro certo, concludere possumus, de *diabeticorum* sangui-

nis principiis ; satis tamen apparet, hæc non solum naturâ et affinitatibus *chemicis* ab iis sanorum sanguini communibus discrepare, sed etiam abundare intermistâ copiâ haud exiguâ alienæ materiæ *vegetabilis* naturæ.

CADA-

CADAVERUM INSPECTIO.

PATEFACTA hæctenus cadavera obscuram *diabetæ* naturam parùm illustrârunt. Nihil-
dum enim morbidi adèdè frequenter oculis
videndum sese obtulit, ut perpetuum morbi
signum habeatur. Quæ tamen morbida ob-
servata sunt, memorari debent.

Cutis haud rarè apparet solito tenuior.
Adeps, ferè ex toto, absorbetur, non solùm ex
partibus exterioribus, sed etiam ex iis partibus
reconditis, in quibus maximè abundare solet.
Hoc verò non perpetuum est; nam, in non-
nullis cadaveribus, vis adipis non sub cute
modò reperitur, verùm in abdomine quoque,
et thorace.

Organa,

Organa, quibus urina aut fecernitur, aut excernitur secreta, morbida conspiciuntur. Renes, supra consuetudinem sanorum, vasculis abundant, neque rarò tument et flaccent. Aliàs autem, per omnia, naturales sunt. Meatus urinæ haud rarò ampliores, quàm ex consuetudine; interdum itidem vesica, rarissimè urinæ fistula.

Ubi solito ampliora sunt hæc itinera, eorum simul tunicæ sunt aliquanto crassiores. Alterutrius nonnunquam lateris ren, simulque urinæ meatus, morbidi sunt; dum ii alterius lateris, sani.

In stomacho et alvo, rariùs morbida conspiciamur. Aliquando tamen tunicæ non stomachi modò, verùm tenuiorum quoque intestinorum cùm crassescunt supra consuetudinem, tum vasis abundant. Præterea, stomachus nonnunquam multò amplior eo sani hominis invenitur.

In plerisque defunctis, *mesenterii* glandulæ plùs minùs tument et durefcunt. Vafa bibula fpinæ etiam aliquando oculis obveniunt ampliora, quàm ex confuetudine.

Non ita pridem, qui cadavera *diabeticorum* ipfo confilio incidebant, ut morbi naturam indagarent et cognofcerent, folas ferè partes rimari folebant in abdomine pofitas, at eas maximè, quibus fecernitur excerniturque urina; partibus intra thoracem vel prorfùs neglectis, vel obiter tantùm et perfunctoriè exploratis.

Nuper verò, ex quo tempore vulgata eft opinio, à RUTHERFORD propofita, aucti urinæ ponderis fontem, ultra ingeftorum fimul fumptorum pondus, in ipsis pulmonibus latere; *anatomici* attentionem, ad has partes earumque vafa *lymphaticà* exploranda, converterunt. Nondum tamen adeò iteratæ funt tales investigationes subtiliores, ut, pro certo, dicere audeamus, quales mutationes hìc perpetuò

petuò reperiendæ sint. In cadavere *diabete* extincti, sicuti THOMAS, *anatomicus* LONDINENSIS, refert, vasa *lymphatica*, pulmones perreptantia, adèò ampliata visa sunt, ut liquorem glutinosum, cinnabare tinctum, facillimè intrmitterent. Glandulæ *bronchiales* compluries obvenerunt in conspectum defunctorum rimantium non tumidulæ modò, sed fabricam quoque demutatæ.

CAUSÆ

CAUSÆ REMOTÆ.

QUIBUS causis oriatur *diabetes*, nondum factis constat. Verifimile autem videtur, quandam quibusdam corporis proprietatem esse, qua apti existunt, qui hoc morbo correpti tabescant, lentâque morte consumantur. Undè verò et quæ fit hæc proprietas, prorsus ignoramus. Nonnunquam gentilitia videtur; cùm præsertim complures, iisdem parentibus orti, *diabete* correpti fuerint.

Neque, enimvero, causæ, quæ *diabeten* concitant, meliùs cognoscuntur, quàm quæ in eum proclives mortales faciunt. Quædam illiusmodi causæ ab auctoribus memorantur, ebriositas, videlicet; potionum dilutiorum

dilutiorum intemperantia; multus eorum medicamentorum usus, quæ urinam citant; immoderatio acidorum fructuum; atque nimietas ciborum, qui saccharo abundant.

Verùm, enimvero, an hæ causæ, aliæve medicorum scriptis memoratæ, *diabeten* faciant, certò scire, in primis arduum est. Auctores, verarum causarum inscii, alii ad alias, retulerunt; quisque ad eas, quæ maximè consentaneæ erant opinioni, quam animo comprehenderat, de ejus natura.

Diabetes olim, uti videtur, rarior erat morbus, quàm nostris temporibus; verùm aliquantò frequentior tamen, quàm ferunt nonnulli auctores. Cùm enim nulla fiat mentio de urinæ dulcedine, notâ certè hujus morbi maximè insigni, priusquam WILLIS observata sua edidit, probabile est, medicos, ante ejus tempora, haud fati *diabeten* ab aliis morbis distinxisse.

Diabetes

Diabetes homines præcipuè inferioris fortis infestat ; mares pariter ac fœminas ; et cujuscunque ferè ætatis, à pubertate ad extremam senectutem.

CAUSA

CAUSA PROXIMA.

PARUM quidem, certè nondum fati, *diabetæ* natura perspecta est. Quicquid igitur, de ejus causa proxima, protulerunt auctores, pro conjectura probabili tantum habendum est.

Nonnulli insigni urinæ mutatione, quæ certè inter notabiliora signa jure censetur, inducti, causam ex prava renum affectione sola quæsierunt. Talis verò causa minimè ad morbum gignendum sufficere videtur, nec ejus fautores in suam opinionem nisi à perpaucis quidem *phænomenis*, iisque ex parte tantùm consideratis, adduci potuissent. Plurima enim *diabetæ* signa corpus

pus

pus universum atque ejus functiones præcipuas turbari demonstrant; et profectò haud credibile est, affectus adeò generales à causa tam singulari profluxuros esse. Quædam, nec rarò, urinæ secretionem abnormem præcedere observantur. Ita aliquando ciborum et potionum appetentia immodica sat diù perstat, et morbum jam inceptum vel incepturum esse indicat, antequam renes ullo modo afficiuntur. Præterea, non sola urina quod ad dotes mutatur, sed alii insuper corporis humores, sudor, nempe, et saliva quidem, de statu sano et naturali declinant. Imò sanguis ipse qualitatum conversiones haud minores, quamvis minùs perspectas, pati videtur; nec dubiè ex converfis ejus principiorum affinitatibus *chemicis* pendentibus; et indè certè cæterorum humorum, ex hoc communi fonte et origine dimanantium, permutatio est petenda.

Perspectis

Perspectis his, atque aliis, quæ vix opus est hîc memorare, quidam summa cum verisimilitudine, functionum, quibus sanguis ex alimentis perficitur, alienationem et depravationem, causam *diabetæ* esse proximam contendunt.

CULLEN, qui omnium primus, quantum scimus, hanc opinionem suggestit, indefinite dixit et cautè; neque, enimvero, ausus est proponere, quo graduum, quibus perficiatur alimentum, vitium accidat. DOBSON verò, qui, uti ferunt auctores, cum CULLEN, hac de re, consensit, expressiùs dixit explanatiùsque, *diabeten chylo* in sanguinem non benè converso attribuendum.

Existimat hic auctor, *chylo*, pariter atque lacti quocum ei similitudo, sacchari semper aliquid inesse; quod, in *diabeticis*, non, uti debet, in sanguinem convertitur, sed, proprietatibus integris, unà cum urina feceritur et mingitur.

Huic autem opinioni objiciatur, sacchari hucusque nihil in *chylo* detectum esse: ex quo utique efficiatur, saccharum, sicubi in *chylo* inest, parcius saltem esse, quàm quod æquet copiam, quam urina suggerit.

De hac igitur rei nostræ parte, nihil certò cognitum proponere possumus. Verùm videtur tamen, quamobrem opinemur, *diabeten* à quadam invaletudine organorum, quibus conficitur alimentum, incipere; atque pravam *chyli* naturam, indè ortam, communem esse fontem, undè nascuntur plurima malorum, quæ ægri patiuntur *diabete* laborantes.

Hanc opinionem haud parùm confirmant affectiones stomachi et alvi, quæ *diabeten* nonnunquam antegrediuntur, semper comitantur.

His igitur cognitis, liceat concludere, causam, quæ *diabeten* continet, seu *proximam*, non in renum vitio latere, sed in perversa

sa quadam et morbosa organorum actione, quibus sanguis ipse *elaboratur*; undè si, ut humor hiccè vitalis, sanitati tuendæ ineptus redditus, varias huic morbo proprias materias gignat. Quî verò et quò procedat morbosa hæc perversio, definiri, adeò adhuc obscura res est, nequit.

Contendunt quidem ROLLO aliique, saccharum, quod urina præbet, formari in iis organis, quorum est rem alimentariam concoquere et perficere. Nihil autem est, quantum scimus, quod hanc opinionem confirmet. Verum quidem est, uti suprà diximus, sanguini *diabeticorum* inesse aliquid naturæ *vegetabilis*; ex quo certè vero haud absimile est, alienam urinæ materiem originem ducere.

Sed, his concessis, nequaquam licet inferre, saccharum, quod suppeditat urina, sanguini itidem infuisse. Contrà, cùm nihildum sacchari in sanguine inventum sit, nonne probabilius videtur, duntaxat elementa sacchari

in sanguine inesse, atque à horum compositione, dum à sanguine fecernuntur, saccharum in renibus ipsis formari; neque, profectò, ad hanc opinionem firmandam, opus esse, ut ullâ renes in valetudine laborarent?

Huic sententiæ contradicendum est, renes nihil à sanguine fecernere, quod non propriâ formâ sanguini inest. Hoc verò non ita esse, nunc fati cognoscimus: namque urina sana duas semper continet materias, quæ, quippe quarum nullum in sanguine existet vestigium, non, nisi *processu* quodam *chemico* in renibus, oriri possunt.

QUORUNDAM SIGNORUM RATIO.

SIGNORUM, quibus cognoscitur *diabetes*, magna, sæpe vix credibilis, urinæ vis, quæ mingitur, medicis maximè mirum visum est. Plerumque, forsan, mira hujus humoris abundantia efficitur magnâ potulentorum copiâ, quam hauriunt ægri, ut importunam sitim, qua nunquam non ardent, aliquatenus sedent.

Haud rarò autem lotium, cùm potulentorum, tum esculentorum, modum excedit, atque medici, alius alio fonte, abundantiam derivant. Plerique existimant, insolitam
aquæ

aquæ copiam, per vasa bibula, quorum oscula in summam cutem patent, perforberi.

Huic sententiæ contradici potest, cutem *diabete* emarcescentium adeò aridam esse, ut vero absimillimum sit, plus solito aquæ perforbere posse. Ex nuperrimis præterea experimentis constat, per cutem, vel bonâ valetudine nitidam, aut nihil omninò, aut faltem multò minus absorberi, quàm medici haud pridem existimabant.

RUTHERFORD *chymicæ*, pariter et naturæ rationis, scientiâ præclarus, qui hunc perobscurum morbum haud parùm illustravit, alium indagavit fontem, undè derivetur urinæ abundantia.

Verisimillimum putat, in vesiculis pulmonum *bronchialibus*, oxygenium animæ spiritu ductæ, cum *hydrogenio*, quo *diabete* tabentium sanguis abundare videtur, societatem inire; atque aquam hinc generatam, vasis

bibulis,

bibulis, quæ in vesiculas patent, absorptam, in sanguinem conduci, undè per renes separetur.

Acutum fanè ingenium perolet hæc opinio; atque, modò accipiamus, exponere haud difficile erit, undè interdum, supra potionum ciborumque modum, urina profundatur. Priùs autem, quàm medici judicant, vera, necne, per omnia, sit hæc opinio, debent, uti monet ipse auctor, comperiri, quales mutationes quantasque subeat aër, qui à *diabeticis* spiratur, et pernoscere, assumptiones, necne, comprobent. Interea verò, hac opinione concessâ, facillimè explicatur, quomodo excitetur ardor præcordiorum, quo ferme perpetuò vexantur *diabete* marcescentes.

Sitis, oris fauciumque siccitas, itemque summæ cutis ariditas, sunt, quòd ita constitutum naturâ corpus est, ut, quantò uberiùs humor quilibet aquosus secernitur, tantò cæteri parciùs.

Macies,

Macies, qua conficiuntur *diabete* ægri, partim ex esculentis potulentisque in sanguinem non perfectis, nedum corpus nutrientibus, oritur; partim, ex resorptis adipe et carnibus.

CURATIO.

CURATIO.

CÆTERIS rei nostræ partibus absolutis, restat, ut, quibus medicamentis remediisque *diabete* emarcescentibus subveniatur, paucis differamus.

Quum verò pleraque eorum, quibus hunc morbum sanare medici conati sunt, parùm, aut omninò non, profuerint, omnia recensere prorsùs supervacaneum esset.

Quocirca, nobis in animo est, ea tantùm memorare, quæ, si morbum non percuraverint, faltem aliquantùm levârunt.

Medicamenta, ex iis quæ astringunt et comprimunt, *diabete* emacrescentibus aliquando permultùm opitulantur. Hujus generis efficacissima sunt *sulphas aluminæ*, et aqua calcis.

E

Quinimo,

Quinimo, eodem morbo emaceratis profunt nonnunquam medicamenta, ex iis quæ roborant, præcipuè *cinchonæ* cortex, et præparata è ferro.

Medicamenta, quæ diximus, itemque alia quædam, haud dubiè *diabeten* sæpe levârunt, atque, ut nonnulli existimant, etiam perfanârunt interdum. Verùm plerumque tamen hæc, pariter atque omnia alia, quæ experti sunt medici, profùs fefellerunt; atque morbus insanabilis videbatur plerisque medicorum, neque profectò immeritò, donec, paucos abhinc annos, ROLLO novâ victûs ratione curationem exsecutus fit.

Saccharum, quod magnâ copiâ cum urina mingitur, ex alimento, dum mitificatur et perficitur, generari ratus, ROLLO induxit in animum, *diabeten*, modò ægri terrâ natis, ex toto, abstinerent, et carnibus cæforum animalium viverent, cibariisque, quæ suggerunt viva animalia, percuratum iri.

Hanc

Hanc victûs rationem in duobus *diabeticis* ad spem respondere ipse comperit. Unus enim ægrorum percuratus est, et alter forsitan itidem perfanatus esset, si strenuè et continenter medici præceptis morem gefisset.

Certior præterea factus hic medicus est, ab aliis, qui cum eo consilia, de *diabetæ* curatione, communicârunt, propositam victûs rationem nedum omnibus hoc morbo marcescentibus plurimùm opitulatam esse; sed aliquos etiam percurâsse, et forsitan omnes perfanaturam fuisse, dummodo, per omnia, haud secùs, ac jussi, fecissent.

Cùm suâ igitur experientiâ, tum eâ aliorum, qui cum eo mutuis sermonibus, aut per literas, contulerunt, inductus, ROLLO sibi persuadet, victûs rationem ab eo propositam, dummodo in ea fati diù et obsequenter perseveretur, omnes *diabeticos*, qui cujuscumque insuper viscerum morbo non simul laborent, ad salutem perducturam.

Dolendum

Dolendum autem est, quòd nupera experimenta non expectationi satisfecerint, quam ROLLO movisset. Namque victûs ratio, quam propofuit, haud rarò, etiam ubi ægri eam perseverantiffimè exsecuti sunt, atque obedientiffimè imperata perfecerunt, spem tamen delufit. Verùm experientia tamen docuit, brevi plerumque tempore malum urinæ habitum emendare, cæteraque levare mala quæ urgeant, neque, profectò, rarò morbum optatò finire.

Quò hæc victûs ratio respondeat, eam, longum in tempus, continuare oportet; neque permittendum est, ut ad pristinam victûs consuetudinem redeatur, donec à morbo homo revaluerit aliquandiu, seque jam confirmaverit; imò, ne tum quidem, nisi gradatim. Quippe enim, ni ab alimentis, quæ suggerit tellus, satis diù et perseveranter abstinenceatur, haud rarò accidit, ut morbus, sicut repulsus

magis

magis quàm extinctus, subito et ex improvise
recrudescat.

Præter rationem victûs, quam exposuimus,
diabete tabentibus aliis simul subsidiis ROLLO
subvenit. Iis enim imperat, ut domi se interea
contineant; simulque assumenda curat me-
dicamenta, quibus sedetur edendi rabies.
Hunc in finem, iis præcipit, ut adhibeant
ammoniam hepatisatam, quæ sanè, ut periculo
compertum est, mirâ nervorum vim sedandi
facultate pollet. Incertum autem est, an
hoc medicamentum rationi curandi, quam
proposuit, ad spem subsidietur.

F I N I S

